

雜病源流犀燭

沈氏尊生書卷二十五

雜病源流犀燭

身形門

身形病源流

沈金鰲撰

人之生也。得天地之氣化以成形。是故頭圓象天。足方象地。四肢象四時。五臟六腑象五行。六極。八節九竅象八風九星。十二經二十四俞。象十二時二十四氣。三百六十五骨節。象三百六十五度。推之。眼目象日月。寤寐象晝夜。喜怒哀雷。涕泣象雨露。寒熱象陰陽。血脈象水泉。毛髮象草木。齒骨象金石。凡人所以備具于一身者。莫不與天地假合以成形。故前人屢申其旨。而人自不之察。故渺視其身。而不能與天地爲昭也。惟其然。故天有陰陽寒暑之愆。人因有百疾之作。亦于是而相應。而百疾之作。由于氣血之失常。其明者。能法陰陽和術數。節飲食。慎起居。謹作勞。保精存液。以

充其形。故能形與神俱。而百疾不作。否則一失其常。而或傷乎氣。或傷乎血。氣傷則餒。血傷則稿。種種病根。悉因乎此。又况風寒暑濕之感于外者。在可禦不可禦之間。饑飽勞役之傷于內者。在或知或不知之際。其來無端。其始無迹。又豈可以智計定哉。然而疾之未作。思有以預防之。疾之既作。必有以調治之。是故醫者可以通神明而扶造化。欲通神明而扶造化。則必先于身形大槩以知其故。而審其原。靈樞曰。人生十歲。五臟始定。血氣始通。真氣在下。故好走。二十歲。血氣始盛。肌肉方長。故好趨。三十歲。五臟大盛。肌肉堅固。血脈充滿。故好步。四十歲。五臟六腑十二經脈皆大盛。以平定。腠理始疎。榮華頹落。鬢髮斑白。氣血平盛而不搖。故好坐。五十歲。肝氣始衰。肝葉始薄。胆汁始減。故目視不明。六十歲。心氣始衰。善憂悲。血氣解墜。故好卧。七十歲。脾氣虛。故皮膚枯。八十歲。肺

氣衰神離。故言善快九十歲。腎氣焦。四臟經脈空虛。百歲五臟皆虛。神氣乃去。形骸徒具而已。素問又曰。人生四十。陰氣自半。起居衰矣。年五十。體重。耳目不聰明矣。年六十。陰痿。氣大衰。九竅不和。下虛上寔。涕泣俱出矣。此人身氣血盛衰之原也。臞仙曰。精者身之本。氣者神之主。形者神之宅。故神太用則歇。精太用則竭。氣太勞則絕。是以人之生者。神也。形之托者。氣也。若氣衰則形耗。欲長生者。未之聞也。類纂曰。穀氣勝元氣。其人肥而不壽。元氣勝穀氣。其人瘦而壽。悟真篇註曰。一身之中。以精氣神爲主。神生于氣。氣生于精。修真之士。不過煉治精氣神三物而已。此人身形存滅之故也。夫苟洞徹乎盛衰之原。以無戾乎生滅之故。則卽身形之內。亦何至有疾病之乘。偶或乘之。亦何不可以治之哉。

養生療病要法

太乙真人七禁文曰。一者少言語。養內氣。二

者戒色慾。養精神。三者薄滋味。養血氣。四者嚙津液。養臟氣。五者莫嗔怒。養肝氣。六者美飲食。養胃氣。七者少思慮。養心氣。人由氣生。氣由神旺。養氣全神。可得真道。凡在萬形之中。所保者莫先于元氣。又曰。欲治其疾。先治其心。必正其心。乃資其道。使病者盡去。心中疑慮思想。一切妄念。一切不平。一切人我。悔悟平生所爲過惡。便當放下身心。以我之天。而合于所事之天。久之遂凝于神。則自然心君泰寧。性地和乎。知世間萬事皆是空虛。終日營爲。皆是妄想。知我身皆是虛幻。禍福皆是無有生。死皆是一夢。慨然領悟。頓然解釋。則心地自然清淨。疾病自然安痊。能如是。則藥未到口。病已忘矣。此真人以道治心療病之大法也。

三精丸

蒼朮天之精 地骨皮地之精 各淨末一升
黑桑椹人之精 二十升 揉爛袋盛取汁將二藥
末入汁中調勻入罐內密封口置棚上晝受日
精夜受月精待自然煎乾為末蜜丸每十九酒
湯任下

延年不老丹

此方久服輕身延年面如童子
何首烏赤白各四兩米泔浸竹刀刮去皮切片
黑豆煎汁浸透陰乾却用甘草汁拌曬乾搗末
不許蒸煮 地骨皮酒洗曬乾 白茯苓酒洗
曬乾各五兩 生地酒浸一宿曬乾 熟地酒
洗曬乾 天冬酒浸三時曬乾 麥冬酒浸三
時曬乾 人參各三兩 蜜丸酒下三五十九
此方千益百補服之十日或一月自已知為別
等入久服功難盡言是作祖之初梯也

附周身諸穴分屬十二經及督任二脉圖 遵照三才圖會并參對歌訣校正無訛

肺經諸穴

雲門巨骨下夾乳旁
 二寸陷中去中行任脉
 六寸 氣戶巨骨下俞
 府兩旁各二寸陷中去
 中行任脉四寸去膺窓
 四寸八分 俞性巨骨
 下雲門旁二寸陷中
 璇璣天突下一寸 天
 突氣喉下四寸宛宛中
 右掖穴之法由天突
 起平璇璣由璇璣至
 雲門其法詳簡後俱
 做此



太陰肺分出中府雲門之下一寸許雲門璇璣旁六寸巨骨之下二骨數天府脇下三寸


夾肘上五寸至尺澤肘中約紋論孔最腕上七寸取列缺腕側一寸半經渠寸口陷

六淵掌後橫紋頭魚際節後散脉舉少商大指端內側此穴若針病即愈


散脉大指本節後

大腸經穴

商陽食指內側。二間來手本節前。三間節後陷中取。谷虎口岐骨間陽谿上側腕中是。
 偏歷腕後三寸安溫瀉腕後去五寸。池前五寸下廉。池前三寸上廉。池前二寸三里。途。
 曲池曲骨紋頭盡肘膠大骨外廉。遠大筋中央尋五。肘上三寸行向來。臂臑肘上七寸量。
 肩髃肩端舉臂取巨骨肩央端上行天鼎喉旁四寸。扶突天鼎旁三寸。禾膠水溝旁五寸。
 迎香禾膠上一寸。大腸經穴自分明。




胃經諸穴



胃之經分足陽明。承泣目下七分。四白目下方二寸。巨髀與乳旁八分。地倉夾吻四分。大迎頰下寸三分。頰車耳下八分。穴下關耳前動脈。頰維神庭旁四。五入迎喉旁寸五。中水突筋前迎下在氣舍。穴下穴項骨。缺盆骨下橫骨內。各去中行寸半。明氣戶璇璣旁四寸。至乳六寸。又四分。廉房屋翳膺窓。乳中正在乳頭心。次有乳根。出乳下各一寸六。不相侵。却去中行須四寸。以前穴道項骨隙。不容巨闕旁三寸。却近幽門寸五。新其下承滿與梁門。關門太乙滑育門。上下一寸無多少。共去中行三寸中。天樞臍旁二寸間。膻下一寸外。陵矣。樞下二寸大巨穴。樞下四寸水道。全膻下六寸歸來是。共去中行二寸。脊氣衝臍上二寸。又去中行四寸。專髀關膝上有尺二。伏兔膝上六寸。是陰市。膝上方三寸。梁邱膝上二寸。記膝臍陷中。犢鼻存膝下三寸。三里至臍下六寸。上廉穴。膝下七寸。條口。膝下八寸。下廉。看膝下九寸。豐隆。係却是踝上八寸量。比那下廉外邊。解谿去庭六寸半。搏陽庭後五寸。換陷谷庭後二寸間。內庭。次指五間陷。厲兌大指次指端。去爪如韭。胃井。

辨經諸穴

期門肝經穴巨
關旁四寸五分
巨關任脈穴
臑上六寸五分
淵液經穴
與下脾經大包
穴相連中府肺
經穴




大包者內側隱白節後陷中末大都。太白內側核骨節後二十公孫呼。商邱內踝微前陷。踝上三寸三陰交。踝上六寸漏谷。是踝上七寸地機。朝聚下內側陰陵泉。血海膝臑上內廉。箕門穴在臑。其脈應于越筋間。衝門期下尺五寸。府舍期下九寸。看腹結期下六寸。凡大橫期下五寸。半腹哀期下方二寸。期門肝經穴道。現巨關之旁四寸。五却連脾穴。休用。能自此以上食竇。天錡。胸鄉。胃經。相去寸六。無冬竅。又上寸六。中府斷。大包腋下有六寸。淵液腋下三寸。能。

心經諸穴



少陰心起極泉中。腋下筋間脉入胸。青靈肘上三寸取。少海肘後端五分。靈道掌後一寸半。通里腕後一寸全。陰郄腕後方寸半。神門掌後兌骨隆。少府節後勞宮直。小指內側取少衝。勞宮心包絡穴在右手節後與左手少府相對。


小腸經腧穴




小指端外為少澤前谷外刺節前章節後握拳取後谷腕骨腕前骨陷側陽谷
 兌骨下陷計腕上一寸名養老支正腕後量五寸少海肘端五分妖肩貞髀下
 兩骨解臍前大骨下陷保天宗秉風後骨陷秉風髀外廉有空曲垣肩中曲脾
 陷肘俞脾後一寸從肩中三寸大抒旁天窓扶突後陷羊天容耳下曲頰後額
 鬢面頰銳端能延官耳端大如菽此為小腸手太陽。

腎經諸穴

足掌心中是湧泉然谷踝下一寸前太谿跟後跟骨上大鐘跟後踵中邊水泉絡下一寸崑崙海蹠下四分交復溜蹠上前二寸交信蹠上二寸踡二穴止隔筋前後大陽之後少陰前築賓內踝上膈分陰谷膝下曲膝間橫骨大赫并氣穴四滿中注亦相迎各關中行止半寸上下相上一寸使上膈百俞亦一寸百俞膈旁十寸透臑前商曲石闕來陰都通谷幽門開谷關中行五分挾六穴上一寸裁步廊神封靈墟在神機或中俞府尊各關中行計二寸上下六寸六穴余俞府璇璣旁二寸取之得法有成功。




膀胱經諸穴



足太陽兮膀胱經。目內眦角始精明。眉頭陷中擡竹取曲差髮際上五分五處
髮上一寸是承光髮上二寸半通天絡郄五枕穴相去寸五調勻看。玉枕夾腦
一寸三入髮二寸枕骨現天柱項後髮際中大筋外廉陷中獻自此夾脊開寸
五第一大孖二風門三椎肺俞厥陰四心俞五椎之下論膈七肝八十胆俞十
一脾俞十二胃十三三焦十四腎大腸十六之下椎小腸十八膀十九中膈內
俞二十椎白環二十一椎下以上諸穴可排之更有上次中下膠一二三四腰
空姪會陽陰尻尻骨旁背部二行諸穴了又從脊上開三寸第二椎下爲附分
三椎魄戶四膏肓第五椎下神堂尊第六噫噎膈闕七第九魂門陽綱十十一
意舍之穴存十二胃倉穴已分十三盲門端正十四志室不須論十九胞百
廿坎邊背部三行諸穴又從醫下陰紋取承扶居于陷中至浮郛扶下方六
分委陽扶下寸六歎殿門扶下六寸長膈中外廉兩筋鄉委中膝膈約紋裡此
下三寸尋合陽承筋根脚上七寸穴在膈腸之中央承山膈下分內間外踝七
寸上飛揚輔陽外踝上三寸崑崙後跟陷中央僕參亦在踝骨下申脉踝下五
分張金門中脉下一寸京骨外側骨際並束脉本節後陷中道谷節前陷中強
至陰却在小指側太陽之穴始周詳


按魄戶對肺俞神堂對心俞魂門對肝俞意舍對脾俞志室對腎俞蓋以肺
藏魄心藏神肝藏魂脾藏意腎藏志是謂五神藏也 白環俞卽腰俞

心包絡經諸穴



心包起自天池間乳後一寸腋下一二天泉曲腋下二寸曲澤屈肘陷中央
 却門去腕方五寸間使腕後三寸量內關去腕止二寸大陵掌後兩筋間
 勞宮屈中名指取中指之末中衝一良

三焦經諸穴



無名指外端閉中液門小指次陷中中渚液下去一寸陽池腕上之陷中外關
 腕後方二寸腕後三寸開支溝腕後三寸內會宗空中有穴細心求腕後四寸
 三陽絡四責肘前五寸看天井肘外大骨後骨罅中間一寸摸肘後二寸清冷
 淵消灤對腋臂外養痛會肩前三寸中渚肩髃膈上陷中央天髎缺盆陷處上天
 髎天容之後存鬲風耳後尖角陷瘼脈耳後青脈兌顛顛亦在青絡脈角孫耳
 廓中間上耳門耳前起肉中和髎耳後動脈張欲知絲竹空何在眉後陷中仔

細詳

折三第

折二第

折一第

膽經諸穴




足少陽今四十三頭上廿六分三折起自瞳子至風池積數陳之依次第瞳子
 際近皆五五耳前陷中尋聽會客主人各上閉全耳前起骨開口空領脈懸壺

之一穴腦空上廉曲角下懸釐之穴異于茲腦空下廉曲角上曲髻耳上髮際
隅率谷耳上寸半安天衝耳後入髮二浮白入髮一寸間敷陰即是枕骨穴完
骨之上有空連完骨耳後入髮際量得四分須用記本神神庭旁三寸入髮一
寸耳上係陽白眉上方一寸髮上五分臨泣用髮上一寸當陽穴髮上半寸月
窓真正營髮上二寸半承靈髮上四寸攢腦空髮上五寸半風池耳後髮際中
肩井肩上陷中求大骨之前一寸半淵液腋下方三寸輟筋期下五分判期門
却是肝之穴相去巨闕四寸半日月期門下五分京門監骨下腰絡帶脉章門
下寸八五樞章下寸八貫維道章下五寸三居髎章下八寸三章門亦是肝經
穴下腕之旁九寸念環跳髀樞宛宛中屈上伸下取穴同風市垂手中指盡膝
上五寸中瀆論陽關陽陵上三寸陽陵膝下一寸從陽交外踝上七寸踝上六
寸外邱用踝上五寸光明穴踝上四寸陽輔分踝上三寸懸鐘在邱墟踝前之
陷中此去俠谿四寸五却是胆經原穴功臨泣俠谿後寸半五會去窵陰穴同
頭上二十穴次第共分三折

一瞳子膠二懸會三主人兮領厭四五懸顛今六懸釐第七數分曲髻隨穴率
谷兮九天衝十浮白兮之穴從十一窵陰亦相繼十二完骨一折終又自十三
本神始十四陽白二折隨十五臨泣日下穴十六目窓之穴宜十七正營十八
靈十九腦戶廿風池依次細心量取之胆經頭上穴堪知


肝經諸穴

足大指內
側為隱白
外側為大敦




足大指端名大敦行間大指經中存太衝本節後二寸跟前一寸號中封後溝
 踝上五寸是中都踝上七寸中膝關橫鼻下二寸曲泉曲膝盡橫紋陰包膝上
 方四寸氣衝三寸下五里陰廉衝下有二寸羊矢衝下一寸許氣衝却是胃經
 穴鼠尾之上寸至鼠尾橫骨端盡處相去中行四寸至章門下腔旁九寸別
 尖盡處側臥取期門又在巨關旁四寸五分無差矣

任脉諸穴




任脉會陰兩陰間曲骨毛際陷中安中極臍下四寸取關元臍下三寸連臍下二寸各石門臍
 下寸半氣海全臍下一寸陰交穴臍之中央即神闕臍上一寸為水分臍上二寸下臍列臍上
 三寸名建里臍上四寸中脘許臍上五寸上臍在巨關臍上六寸五分尾蔽骨下五分中庭臍
 下寸六取臍中却在兩乳間臍上寸六玉堂玉臍上紫宮二寸二臍上華蓋四八象臍上璇璣
 五寸六璇上一寸天突起天突喉下約四寸廉泉下營去已示漿關前唇後下任脉中央行

脈度




七衝門圖


唇爲飛門 齒爲戶門 大倉下口爲幽門 大小腸爲闕門 胃爲賁門
 會厭爲吸門 下極爲魄門



臟腑配面圖



肢節配面圖




附身瘡癩疔圖


發背形如蓮子或多突
出者是也 高腫膿潰
者生平塌陰陷者死

發背形如蜂巢頭含
螺子片片腐爛孔孔
流膿者是也 紅活
者生黑陷者死

一切瘡疔不盡



蓮子發



蜂巢發

井疽心火妄動而成 狀
赤高腫者生堅硬紫黑者
死





玉枕疽膀胱熱凝結
而成 紅腫者生黑陷
者死

對心發心火沸騰濕熱
浸淫而成 腫高腐潰
者生取陷紫黑者死



天疽乃場火熾甚而發
紅赤高腫者生紫黑
平陷者死

對口疽太陽經濕熱結
聚而成高腫易腐者生
平塌堅硬者死




附骨疽初起大脛筋骨作痛
 久則漫腫 腫出黃稠者生
 氣敗者死

失榮生于耳之前後及項間
 初如痰核久則堅硬漸大如
 石破後無膿惟流血水堅硬
 仍作腫痛異常乃百死一生
 之症





賈母



耳後發

脾壯者乃飲食炙博厚
味酸成 紅赤高腫潰
爛者生平陷紫黑者死

人面瘡乃前生冤業所致
先以省修方可醫治



脾壯者




人面瘡



凡外症高腫為癰沉潰
為疽有膿者生無膿
者死



出胃口疽發在心胸之
 旁有頭為湯無頭為
 陰乃飲食多痺所致





唇疽生唇上有頭
腫起寒熱交作乃
胃經積熱所致



流注所發不論穴
道隨處而生漫腫
無頭皮色不變一
二個起至十一個
止









小腸瘕腹疾臍突是也




下馬坐馬二癩又名醫癩

結毒乃硬腫臭穢
腐爛者是也



楊梅瘡



龍泉瘡

鈕扣風頂上如癩作痒
不止
腺瘡亦名裙風瘡


乳岩中空似岩穴遺
腫若泛蓮頂死候也



乳疔紅腫發熱疼痛
是也



乳疽堅硬腐爛是也



卷之三十一

筋骨皮肉毛髮病源流

沈金鰲撰

筋也者。所以束節絡骨。絆肉。襯皮。爲一身之關紐。利全體之運動者也。其主則屬于肝。故曰筋者肝之合。按人身之筋。到處皆有。縱橫無算。而又有爲諸筋之主者。曰宗筋。內經註謂。陰毛橫骨上下之堅筋。上絡胸腹。下貫臍尻。又經于背腹。上頭項者是也。筋之總聚處。則在于膝。靈樞云。諸筋者。皆屬于節。節卽膝也。所以屈伸行動。皆筋爲之。然則筋之有關於人身。豈淺鮮哉。試詳言筋病。曰筋急。曰筋緩。曰筋攣。曰筋痿。曰筋惕。曰筋傷。曰筋結。曰轉筋。曰筋絕。其名曰如此。靈樞皆以寒熱分急緩之由。謂寒則反折而急。熱則弛縱而緩。得效。又以筋急爲寒。急者堅強。筋縮爲熱。縮者短促。弛緩爲濕。緩者寬長。又言但熱不會受寒。亦使人筋緩。是其意。寔以縮卽爲拘攣之義。而但熱之緩。不過舒長。受濕之緩。乃竟舒長無

力。分析尤爲細密。若仲景言血虛則筋急。此又筋急之原。由血脈不榮于筋之故也。丹溪以四物湯治筋急。本事方以養血地黃湯治筋急。蓋本乎此。然觀于筋急之原。血虛即可知。筋緩之原。血熱無足疑者。筋急宜酒煮木瓜粥。筋緩宜五加皮散。若夫熱勝風搏。併于經絡。風火相乘。是以瞽瘖。此卽筋擊之由也。故筋攣亦曰筋瘈。瘈者瘕症。卽俗云搐是也。其症亦往往作痛。宜祛風經曰。肝氣熱則胆泄口苦。筋膜乾筋膜乾則筋急而攣。發爲筋瘈。思想無窮。所願不得。意淫于外。入房太甚。宗筋弛縱。發爲筋痿。則是筋瘈寔生于肝熱也。胆附肝。惟肝熱故胆洩。筋膜乾而成瘈者。血液槁也。宜紫葳湯。傷寒發汗過多。則傷其血。血虛無以榮筋。因拘急而惕惕然跳。且四體百骸亦矜矜然動。是筋惕肉矜。由于筋肉失養。陶節菴謂宜用四物湯去地黃。加人參茯苓半夏甘草作劑。佐以五靈脂入生姜烏梅煎服。

自有神效。以藥齒王生血。生血乃所以收汗。此真武湯久行傷筋

者。筋王運動。久行則太勞而致傷也。宜養肝丸肝之經脈不調。氣血失

節。往往有筋結之患。不論骸體間。纍纍然若胡桃塊狀是也。宜以木杓

打之三丹溪以轉筋屬血熱。恐但血熱猶不至患轉筋。必先血熱

于內。而又感風寒之故。其症并有始轉于足大指。轉上至大腿。且

近腰者。宜四物湯加酒苓霍亂後轉筋。緣胃大腸皆以榮宗筋。暴

吐暴瀉。則胃大腸之津液驟亡。宗筋失養。故輕則兩腳轉筋。重則

至于遍體。且入腹。手足逆冷。危在頃刻也。宜木瓜湯理中湯加石膏靈樞曰。筋

絕九日死。何以知之。手足爪甲青。呼罵不休。手足爪甲色青者。肝

色也。則知筋絕。肝亦絕矣。審是而筋之為病。其可忽哉。

舒筋法 得效曰。此法治破傷後筋攣縮不能伸。他病筋縮亦

可。大竹管長尺餘。兩頭鑽一竅。係以繩。掛于腰間。每坐舉足。搓

袞之勿計工程久當有效一人墜馬折脛脚筋攣縮不能行步
遇道人傳以此法數日便愈如常

骨也者所以爲一身之撐架猶屋之有樑柱然也屋非樑柱不能
豎人非有骨不能立也經言腎主骨又言骨者髓之府是惟腎氣
足故髓充滿髓充滿故骨堅強也骨有本顙骨也凡人一身骨格
有大有小骨大者顙必大骨小者顙必小驗之人人而靈樞之言
益足信也凡人一身之骨最大者脊骨也經言脊骨以下至尾骶
二十一節長三尺脊節謂之節脊窮謂之骶是不但爲骨之最大
且居中麗正一身之骨皆于是附猶屋之正楔且爲一身之骨之
主也而其爲病約有四端一曰寒內經言人有身寒湯火不能熱
厚衣不能溫然不凍慄者以是人素腎氣勝以水爲事太陽氣衰
腎脂枯不長一水不能勝兩火腎者水也而生于骨腎不生則髓

不能滿故寒甚至骨也所以不能凍慄者肝一陽也心二陽也腎

孤臟也一水不能勝二火故不能凍慄病名骨痺是人當擊節也

據經之言骨寒之病甚深非但浮淺惡寒之謂也宜溫腎散加附子肉桂虎骨

一曰熱其熱從骨間蒸發按之雖不甚烙手然覺有鬱蒸不可耐

狀有非飲湯引水所能解其板齒必乾燥以齒者骨之餘板齒尤

諸齒之門戶骨熱故板齒乾燥即經言髓涸齒乾乃為骨熱病者

是也宜滋陰降火湯加龜甲地骨皮其或因骨熱至四肢緩弱不舉髮鬢成骨痿

之症矣一曰痿內經言腎氣熱則腰脊不舉骨枯而髓減發為骨

痿有所遠行勞倦遲大熱而渴渴則陽氣內伐內伐則熱舍于腎

腎者水臟也今水不勝火則骨枯而髓虛故足不任身發為骨痿

也據經之言骨痿之病由于骨熱非但尋常疲弱之謂也宜虎一

日痛人身之痛或由風淫濕滯或由血刺痰攻淺不過肌肉皮毛

深亦止經絡臟腑。若入裏徹骨作痠作疼。雖因寒因熱。有不同。要其損傷勞極為至甚。而無加矣。宜虎骨散二妙散他如久立傷骨。骨傷之病。或亦有痛者。或漸至成痿者。當受傷之初。不可不急救也。宜補茸骨碎補迨至骨絕。齒必黃落。雖有藥餌。不可救矣。經故斷之為十日死也。

骨病症治 難經曰。少陰者。冬脉也。伏行而濡骨髓者也。直

指曰。骨為髓之藏。髓者。飲食五味之寔秀也。髓虛則骨虛。勢所必至也。又曰。骨熱病。當與骨蒸門參看。資生曰。扁鵲云。病在腠理。湯熨之所及也。在血脉。針石之所及也。在腸胃。酒醴之所及也。其在骨髓。雖司命無柰之何矣。夫病在骨髓。扁鵲以為難。則骨髓有病。病亦熾矣。

皮也者。所以包涵肌肉。防衛筋骨者也。皮之外。又有薄皮曰。膚。俗

謂之枯皮。經言皮膚亦曰腠理。津液滲洩之所曰腠。文理縱會之

中曰理。腠理亦曰元府。元府者汗孔也。汗液色元從空而出。以汗

聚於裏。故謂之元府。府聚也。皮之所主為肺。故凡風寒之邪襲人

肺先受之。以其先入皮毛也。邪着皮毛。腠理開洩。然後入于絡脉

侵及于經。發而為病。其理然也。皮之為病。若癢疥。另詳本條若癰疹。另詳

本條若瘰癧。另詳本條若麻木。另詳本條若癩瘖。另詳本條皆皮之病。前既詳言。茲

可勿贅。其所常有者。無過痛痒兩端。故經曰。痒痛生于皮毛。又曰

諸痒為虛。血不榮肌。又曰。諸痛皆屬于火也。血虛之痒。如重行皮

中。宜大料凹物湯。兼用澡洗藥。皮虛之痒。淫淫不已。宜四物湯加黃芩煎。風邪

之痒。痒甚難忍。宜菊花散去石膏加薄荷。酒後之痒。痒如風瘡。常搔至血出。宜

散。心寔之痛。深至肉間。宜導赤散加減。火灼之痛。如欲炙手。宜加減風熱

之痛。痒痛相間。宜上清散。肺經火鬱之痛。不可撫按。宜瀉肺湯。痒痛之因。內

外各異如此。然為痒為痛。又有因于火之微甚者。河間云。人近火。微熱則痒。熱甚則痛。附近則灼而為瘡。皆火之用。或云。痛為寔痒。為虛。非謂虛為寒。正謂熱之微甚。此河間之論。又于痒痛所因之外。就火之一端。以析痒痛者也。若乃丹毒者。亦皮之病。人身忽然變赤如丹。塗名赤瘤。或因瘡而得。嫩赤者。名瘡瘤。皆遊走無定狀。如雲氣。總緣惡毒熱血蘊結命門。遇君相二火合起。致發此症。其輕者亦緣風熱所致。總治宜四順清涼飲外塗拔毒散。又有皮膚忽起赤暈。或發熱作痒。或搔破出水。名赤遊風。亦謂之丹毒。然其症狀。畢竟與丹毒稍異。宜臨症分辨。而遊風之因。起于脾肺氣虛。腠理不密。風熱相搏。宜刺防敗毒散。或端由風熱。宜小柴胡湯加防風連翹。或端由血熱所致。宜四物湯加柴胡山梔。治之。但宜涼血消風。清肝養血。則火自息。痒白止。切不可單用祛風之藥。反燥肝血。使元氣虛而別生他症。若素有病面上

忽見紅點多死。試舉毒遊風之屬。條列言之。有赤瘤丹毒者。宜

名異末蒸汁 有赤黑丹疥。或痒或燥。不急治。遍身即死者。宜白蘆

調塗立消 脂調 有五色丹毒。俗名遊腫。犯之多死者。宜榆白皮末 有火丹赤

腫遍身者。宜磨大黃 有火焰丹毒。從頭起者。宜生葱 有火丹發足

脛以上者。宜鏡面草打 有火霞丹毒。從兩脚起如火燒者。宜五加

燒灰煨鐵槽。汁服并敷 有不拘何處火丹發而疼腫難忍者。宜鱧頭 有烟火

丹發從背起。或兩脇及兩足。其赤如火者。宜景天草珍珠各一 有

螢火丹。從頭起。亦名熱毒丹瘡者。宜慎火草搗 有幼小火丹者。宜

芥末水 有一切熱毒丹腫腮痛者。宜赤小豆末 有丹從臍起者。宜

調塗 有身面卒得赤斑。或癩子腫起。不治即死者。宜羊角燒灰

有身面丹腫如蛇纏狀者。宜馬蘭草 有赤遊丹發腫痛者。宜瓜葉

敷。雖然丹毒之發。又有辨焉。其痛者為丹毒。其痒者為風丹。有一

切風丹發痒不止者。宜炙穿山甲末一兩生甘草末三錢米飲調塗有冷風丹者。宜白姜

有遍身風痒如癩疹者。宜菱香花末酒下一錢立效有皮膚風熱遍身生如粟

木者。宜牛蒡子浮萍等分薄荷汁調酒下二錢日二次有遍身本發癩疹後變成瘡又痒

又痛者。宜姜蚕焙末酒服二錢立愈有血風丹腫起疙瘡者。宜浮萍汁和豆淋酒下有因

酒而得風丹遍身痒者。宜浮萍散且夫丹毒之發更有辨焉其色赤者

為丹其色白者為癩如前言冷風丹其色亦白即癩之類也治癩

之法前人以酒調土朱服之得愈蓋癩為脾病土能入脾朱能除

白也。白癩宜消風散至若小兒血熱肌虛風邪相湊易發丹毒得之百日

內者尤為危急。宜消風散黑神散二方兼服外以金花散塗總之丹毒遊風之發不問

大人小兒或發手足或發腹上總以自腹生出四肢者為順而易

治自四肢生入腹者為逆而難治不可不知也夫丹毒之發甚暴

活丹毒之方甚多古人有十二種單方治一切丹毒但得于十二

味中。水苔生地生松毛蒟藿葉煥火草浮萍硝石豆葉以上皆搗爛敷豆豉大黃黃芩山梔以上皆為末水和敷用一

二味。即能取效。良為簡便。又不可不知也。然而皮之為病。且不特

此也。如人身體皮肉變色。赤者為紫癩風。白者為白癩風。紫由風

與血搏。血不調和所生。宜紫癩風方白由風與氣搏。氣不調和所生。宜

風丸三黃散總治紫白癩宜加蕪何首烏丸又如面及頸項身體皮肉色變。與肉色不

同。不痛不痒。由肺風流注皮膚之間。久之不去。遂致浸淫。遍體為

白駮。宜白駮方又如頸項胸前腋下。自生斑點。相連。色微白而圓。或紫

不痛不痒。由風邪積熱。居于肺腑。久之不散。流溢皮膚。為癩瘍風。

宜烏蛇散又如心常驚恐。言語無定。眼前見物如垂絲。皮肉中或如桃

李癩疹。色赤黑。手足頑麻刺之。不痛。身體生瘡。痛痒如虫行。由惡

風相觸。及犯忌害。初即覺皮毛變黑。為烏癩。又名黑癩。宜大黑神膏又

如語聲嘶。頃目視不明。四肢頑痛。身體發熱。手足緩縱。背脊拘急。

身形 技

卷五 七

皮肉之內。似生癢疹。其色正白。亦由風邪毒氣。積久爲白癩。宜白
花蛇
散苦。又如肺氣不榮。津液枯涸。皮聚毛落。爪枯甲錯。肌膚乾澀。而
不滑潤。爲索澤。宜入
物湯凡若此者。皆皮之病。凡屬司命所當一一詳
審者也。

脉法 仲景曰。脉浮而大。浮爲風虛。大爲氣強。風氣相搏。以成
癢疹。身體爲痒。痒者名泄風。久久爲痂癩。 正傳曰。脉浮而緩。
屬濕。爲麻痺。脉緊而浮。屬寒。爲痛痺。脉澀而芤。屬死血。爲木不
知痛痒。 滑伯仁曰。脉者血之波瀾。發斑者血散于皮膚。故脉
伏也。

皮病症治 河間曰。痒得爬而解者。爬爲火化。微則亦能痒。甚
則痒去者。謂令皮膚辛辣。而屬金化。辛能散火。故金化見。則火
化解矣。 入門曰。丹毒入裏。腹脹則一死。毒氣所走之處。急以細

針刺出惡血。卽消。又曰溝渠中小蝦搗敷妙。或伏龍肝雞子白調塗。或鯉魚血。鱈魚血。芭蕉根汁。藍葉汁。水中苔塗之皆可。

肉也者。所以主一身之肥瘦。而驗氣血之盛衰者也。內經曰。肥而澤者。氣血有餘。肥而不澤者。氣有餘。血不足。瘦而無澤者。氣血俱不足。此經但言其槩也。其寔人之肥者。血則寔而氣必虛。故行動多喘促。氣虛也。能耐寒而不能耐熱。熱傷氣損。其不足之氣。則陽愈弱而偏于陰。故不能耐熱也。人之瘦者。氣則寔而血必虛。故皮膚多燥澀。血虛也。能耐熱而不能耐寒。寒傷血損。其不足之血。則陰愈虧而偏于陽。故不能耐寒也。此肥瘦之所以分也。肉之爲病。最重者曰食飢。飲食多而易饑。不生肌肉。如死人也。由胃中結熱。消穀之故。宜參苓元其次曰肉苛。苛者癩重也。由榮氣虛。衛氣寔之故。宜前胡散其次曰肉痿。胃乾而渴。肌肉不仁。無力以運。由脾經傷熱之

故。宜清。其次曰肉脫。形肉瘦削而脫盡不能行動。蓋脫者空也。謂

肉消而皮與骨着。中空無有也。此亦死症。由真元內竭。穀氣外衰

之故。宜谷靈丸。至如瘡瘍雖愈。有肉凸出。小如豆。大如李。長至數寸。名

曰贅肉。亦曰努肉。宜烏梅肉搗作餅貼肉上即消去。又如手足忽生如豆。甚至三

箇五箇相連而生。由風邪搏于肌肉所致。名曰疣目。宜烏雞膽汁日三塗之。或

杏仁燒研塗之。又如肌肉間忽生紅粒。撫之則痛如錐刺。血虛襲風所致。

名曰肉刺。可不必治。以上皆肉病所及也。若夫耳龔舌短。背腫尿

血大便赤泄。則為肉絕之候矣。經故斷之為六日死也。

肉病症治。內經曰。胸為內標。膈膝後肉如塊者。資生曰。羸

瘦固瘵疾。若素來清臞者。非有疾也。惟病後瘦甚。久不復常。謂

之形脫。與夫平昔充肥。忽爾羸瘦。飲食減少。此為五勞六極之

疾。宜服滋補藥。

毛髮也者所以爲一身之儀表而可驗盛衰于衝任二脉者也夫
毛髮爲血之餘似已然衝爲血海任爲陰脉之海二脉皆起胞中
上循腹裏其浮而外者循腹右上行會于咽喉列而絡唇口血氣
盛則充膚熱肉血獨盛則滲皮膚生毫毛然則毛髮之生皆由二
脉之盛也明矣內經獨以屬腎者腎主精精卽血也毛者統詞一
身之毛及眉鬚髭鬣前後二陰之毛皆是髮者專指但卽生于頭
者言也鬚髮之有無榮悴前人論之甚詳故不贅其有左右髮際
起瘡如粟米頭白肉赤痛如錐刺者爲髮際瘍皆因風熱上攻之
故雖膿出無傷也宜防風通聖散然婦人多患之男子則少髻疽者亦名
髻發生髻髮中初如虫咬癢疹腫痛難見或由肝胆二經怒火或由
由三焦相火或由風熱血虛皆能生此症但由三焦相火者尤忌
出膿以是經血少氣多也甚則發熱作渴宜柴胡清肝湯腫高痛極宜仙方

命。迨大勢已定，餘毒未除，以參芪歸朮為主，佐以川芎、白芷、金銀花，速成其膿，膿成仍以參芪等托而潰之。至生肌收斂，則全用補益。脾虛加四君子湯，血虛宜四物湯，小兒癩頭白禿瘡亦生髮中，宜益湯加參芪氣虛宜補血益氣湯。脂其一種狀如葡萄久而不膿者名髮毛瘡，宜苦棟根灰然若中陷四邊高色如黃蠟者乃是廣瘡不可作髮毛瘡治也。

毛髮原由症治。醫說曰：髮屬心，故上生。稟火氣也。眉屬肝，故橫生。稟木氣也。鬚屬腎，故下生。稟水氣也。入門曰：胆榮于鬚，腎華于髮。精氣上升則鬚潤而黑，六八以後精華不能上升，秋冬令行，金削水枯，以致鬚髮焦槁如灰白色。養生者宜預服補精血藥以防之。如張天師草還丹、四物坎離丸、五老還童丹之類，染掠亦非上策。

治筋病方十

酒煮木瓜粥 用酒一宿三五度便差 木瓜酒水煮爛研作膏熱裹痛處冷

五加皮散 錢酒下 五加皮 油松節 木瓜 每末二三

祛風滌熱湯 連喬 竹葉 薄荷 甘菊 牛蒡子 防風 荆芥

紫葳湯 筋連 紫葳 天冬 百合 杜仲 黃芩

四物湯 筋傷 川芎 當歸 白芍 生地 兔絲子

養血地黃湯 筋急 麥冬 熟地 生地 白芍 當歸 阿膠

真武湯 筋傷 附子 生姜 白芍 白朮 茯苓

養肝丸 羌活 蜜丸 川芎 當歸 白芍 熟地 防風

木瓜湯 轉筋 炙草四分 烏梅一个 木瓜四錢 吳萸二錢 茴香一錢 紫蘇十葉 姜三片 鹽一撮

理中湯 人参 白朮 甘草 乾姜

治骨病方五

溫腎散

骨寒 熟地錢半 牛膝 肉苁蓉 巴戟
麥冬 五味子 炙草各八分 茯苓 炒杜
仲 乾姜各五分 水煎服或為末酒下二錢
亦可

滋陰降火湯

骨熱 白芍錢三分 當歸錢二分 熟地
白朮 天冬 麥冬各一錢 生地八分 陳
皮七分 蜜知母 蜜黃柏 炙草各五分
姜三棗二

虎潛丸

骨痠 龜板 黃柏各四兩 知母 熟地各
二兩 牛膝三兩半 陳皮七錢 白芍一兩
半 乾姜五錢 鎖陽 虎骨 當歸各一兩
酒糊丸 加附子尤妙

虎骨散

骨痛 虎骨二兩 白花蛇肉 天麻 白姜
蠶 牛膝 防風 酒當歸 乳香 肉桂各
一兩 全蠍 炙草各五錢 麝香一錢 每
末二錢酒下 一方有自然銅白附子枳椇
活白芷川芎各一二兩地龍沒藥雄黃各五錢治
白虎歷節風走痛如神

二妙散

又 製蒼朮 酒黃柏 等分姜湯下一錢

治皮病方二十六

四物湯

皮癩 川芎 當歸 白芍 地黃

菊花散

又 甘菊 防風 枳壳 羌活 旋覆花

蟬脫散

又 石膏 甘草 蔓荊子 薄荷 等分每末二錢酒水調下

上清散

皮痛 元參 薄荷 荆芥 甘草 歸尾
桔梗 陳皮 黃芩 川芎 枳壳 或加梨
大黃亦可

導赤散

又

加減涼膈散

又 薄荷 連喬二錢 甘草錢半 山梔 黃芩

瀉肺湯

又 山梔 地骨皮 桑皮各二錢 知母 貝母
桔梗 麥冬 生地 甘草各一錢

四順清涼飲

丹毒 薄荷十葉 當歸 赤芍 炙草各錢二

拔毒散

又 寒水石二兩三錢 石膏一兩 黃柏
草各二錢 水調塗之 芭蕉汁尤妙

荆防敗毒散

胡 荆芥 防風 羌活 獨活 柴胡 前
人參 赤芍 桔梗 枳壳 川芎 甘草

小柴胡湯

又 柴胡 黃芩 人參 半夏 甘草

白殭蚕散

又 白芷 姜蚕 蟬退 防風 甘草 蒼耳子
川芎 茯苓 荆芥 厚朴 陳皮

身形 皮肉方

人參 等分每末二錢豆淋酒下

浮萍散

又 浮萍五錢 防風 黃芪 羌活各三錢
當歸二錢 乾葛一錢 麻黃五分 生草四分
量疾重輕分二三服水煎

消風散

白瘰

黑神散

小兒

金花散

又 鬱金 黃芩 山梔 甘草 大黃 黃連 糯米 等分為末蜜水調敷

紫癩風方

紫癩 官粉五錢 硫黃二錢 為末雞子白調搽

追風丸

白麩 首烏 苦參 蒼朮 荆芥穗各四兩
共為末 用皂角二斤去皮弦子水煎膏和丸
空心酒茶任下三五十九

三黃散

又 雄黃 硫黃各五錢 黃丹 天南星 枯礬 密陀僧各三錢 先以姜汁捺患處再以姜片蘸藥擦後漸黑次日再擦黑散則無矣

加何首烏散

紫白癩 首烏 石菖蒲 蔓荊子 苦參 荆芥穗 威靈仙 甘菊 杞子 等分每末

白駁方

三錢蜜茶調下
此方兼治癩瘍風白駁一切疥癬
白駁 硫黃 草決明 生半夏 剝皮各
兩 蛇脫一條 二味燒研 共為末 清漆和調
薄塗患處先用巴豆一粒中截擦白處再用藥

烏蛇散

癩癬風 烏蛇三兩 犀角一兩 防風 羌
活 黃芩 苦參各二兩 人參 丹參 元
參 沙參 肉桂 秦艽 川芎 山梔 升
麻 通草 枳殼 白蒺藜 白蘇皮各一兩
每末二錢酒下

大黑神膏

烏癩 川烏 川芎 升麻 防已 黃柏
藜蘆 黃連 明礬 雄黃 雌黃 胡粉各
五錢 巴豆 杏仁各十四粒 松脂 亂髮
各如鷄子大一塊 右剉如豆用猪油二升同
煎以髮輝為度棉濾去渣入雌黃礬胡粉攪
勻取堯器中每用塗瘡一日三四次每用藥以
熱鹽湯洗過然後塗之毋及口眼

白花蛇散

白癩 白花蛇酒浸 晚蚕蛾去頭足翅 威
靈仙 天麻 槐子 羌活 防風 枳殼
白鮮皮 蔓荊子各一兩 炙草五錢 每末
二錢酒下日二次不拘時

苦參酒

又苦參五斤 蜂房五兩 蟬皮一具 水
三斗 煮一斗去渣 浸細麵五斤 炊飯二斗 如常
作酒 溫飲一二杯

八珍湯

索澤症 人參 白茯苓 白朮 炙甘草
川芎 當歸 白芍 地黃

治肉病方四

參苓元

食餅 人參 遠志 赤苓 菖蒲 生薑酒
浸 地骨皮各一兩 蜜丸 不拘時 米飲下

前胡散

肉苧 前胡 白芷 細辛 官桂 白朮
川芎各三兩 吳萸 附子 當歸各二兩
川椒三錢 右剉以酒茶三升 拌勻 審一宿以
猪油五斤 入藥 微煎 候白芷黃色 去渣 煎成膏
摩病處 以熱為度

清燥湯

肉瘻 黃芪 白朮各錢半 蒼朮一錢 陳
皮 洋鴻各七分 赤苓 人參 升麻各五
分 生地 當歸 猪苓 麥冬 神曲 甘
草各三分 黃連 黃柏 柴胡各二分 五
味子九粒

谷靈丸

肉脫 黃芪 人參 牛膝 當歸各一兩
附子炮一个 熟地 茯苓各五錢 杜仲

蒼朮 白朮 肉桂 杞子各三錢 酒糊丸
參湯下百丸

治毛髮病方十

防風通聖散

髮際瘍 滑石錢七分 甘草錢二分 石膏
黃芩 桔梗各七分 防風 當歸身 川
芎 赤芍 大黃 麻黃 薄荷 連喬 芒
硝各四分半 白朮 荆芥 山梔各三分五
厘 姜三片

柴胡清肝湯

鬚疽 柴胡 山梔各錢半 川芎 黃芩
人參各一錢 桔梗 連喬各八分 甘草五
分 食後溫服

仙方活命飲

又 穿山甲 白芷 防風 赤芍 甘草
歸尾 花粉 貝母 角刺各一錢 陳皮
金銀花各三錢 沒藥 乳香各一錢 二味另
研 水酒各半煎送乳沒二末

四君子湯

又 人參 茯苓 白朮 炙草

四物湯

又 川芎 當歸 白芍 地黃

補中益氣湯

又 人參 黃芪 當歸 白朮 升麻 柴
胡 陳皮 甘草

松脂膏

張師草還丹

四物坎離丸

五老還童丹

身死 耳聾

龍王

白朮 松脂 黃連各七錢半 黃芩 苦參 各一兩 蛇床子二錢半 大黃 枯礬各五錢 水銀兩半 胡粉五錢 合水銀入少水全研令無星為度 共研勻 臘猪油調塗瘡上 預防 地骨皮 生地 石菖蒲 酒煮兔絲子 牛膝 遠志 等分 蜜丸空心 監湯下三 五十九 修合忌鐵器及女人雞犬

又 熟地三兩 生地兩半 同酒浸打膏 當歸二兩 白芍兩半 全酒炒 知母一兩 黃柏二兩 全鹽酒浸炒 側柏葉 槐子各一兩 全炒 連喬六錢 蜜丸盛磁盒內放地上七日 曬乾收之 酒下五六十丸

又 茯神 赤石脂 川椒炒出汗各一兩 硃砂水飛 乳香燈心同研各一兩 俱另為末 用鷄子二个去清黃只將硃砂乳香各裝一壳 內紙糊七重 青絹袋盛之 令精壯女人懷肚上 常令溫暖 硃砂懷三十五日 乳香懷四十九日 取出再研前三藥亦為末和勻 蒸棗肉和丸 空心酒下三十九 參湯下尤妙 一月外加至四十 丸以甲子庚申夜靜處修合 忌雞犬女人見 又名返齡萬壽丹 本仙家方也

附錄毛髮雜方

眉毛不生方 芥菜子 半夏 等分爲末姜汁調搽數次即生

治人無髮方 甜瓜葉搗汁塗之即生

病後髮落方 鮮猴姜 野葛嫩嫩枝煎汁刷之

令髮長黑方 桑葉 生麻油 煎過去渣沐髮令長數尺

鬚髮黃赤方 生地一斤 生姜半斤 各洗搗汁留渣用 不

入鱧泥同煨存性研末鐵器盛之每末三錢湯調停二日臨卧刷染鬚髮即黑

秘傳烏鬚方 起即提下攪之從容上火慢炒色黑爲度以濕

青布包扎足踏成餅收貯聽用每用時先以皂角水洗淨鬚髮用五倍子末二兩酒炒紅銅

末錢六分 生礬六分 訶子肉四分 烏梅酸榴

子四分 硃砂一分 共研極細 烏梅酸榴皮煎湯調勻碗盛重湯煮四五沸待如飴狀

以眉掠刷于鬚髮上一時洗去再上包佳次日洗去以桃核油潤之半月一染甚妙

巫雲散

胆礬 五倍子 百藥煎 青胡桃皮 酸石
 榴皮 訶子皮 木瓜皮 猪牙皂角 何首
 烏 細辛 等分 爲末 蜜和 如錢大 常放 木炭
 丙培 養勿令 雜炭 用時 以熱酒 化開 塗之
 子 刺子 白芷 沒石 子 躑躅花 訶子皮 覆盆
 生地 芒硝 沉香 防風 附子 零陵香
 卷柏 三錢 右剉 絹袋 盛將 清香油 八兩 浸入
 封過 七日 取擦 頭上 日三次
 黃白 不澤 此綠 雲油 能生 髮
 巫雲散 治鬚髮

金玉綠雲油

頭痛原流

沈金鰲撰

頭痛經氣逆上干過清道不得運行病也。統天氣六淫之邪。人氣六賊之逆。皆有之。經曰。風氣循風府而上。則爲腦風。新沐中風。則爲首風。此蓋以太陽之脉達風府。太陽受風。則腦痛而爲腦風。又以沐則腠開。風傷于衛。故也。經又曰。頭痛數歲不已。當犯大寒。內至骨髓。髓以腦爲主。腦逆。故頭痛齒亦痛。名曰厥逆。此蓋以大寒入腦。則邪深。故數歲不已。髓者。骨之充。齒者。骨之餘。故頭痛齒亦痛。是邪逆于上。故曰厥逆也。宜羌活附子湯經又曰。頭痛巔疾。下虛上寔。過在足少陰。巨陽甚。則入腎。此蓋以頭痛本太陽病。太陽之脉交巔上。其直者從巔入絡腦。下虛少陰腎虛也。上寔太陽膀胱寔也。腎虛不能攝太陽之氣。故虛邪上行而頭痛。其脉必舉之。弦按之堅。宜玉真丸經又曰。頭痛耳鳴。九竅不利。腸胃之所生。此蓋以腸胃爲

衝門之道路。氣之所以往來。氣虛則不能上升于巔頂。故頭痛。宜補

中益氣湯。經又曰。頭痛甚。則腦痛。手足寒至節。死不治。此蓋以三陽受

邪。伏而不去。則陽氣敗絕。故手足之寒。上至于節也。統而觀之。經

之論。頭痛總不越風寒虛三者。其旨固瞭然也。雖然。各經所犯。頭

痛。其為痛處。與其現症。脉候及應用之藥。有不得不分。辨者。太陽

經痛在正巔。其症兼惡風寒。其脉必浮緊。宜川芎麻黃少陽經痛

在耳前髮際。其症兼寒熱。其脉必細而弦。宜柴胡陽明經痛在額

間。其症兼自汗。發熱惡寒。其脉必浮緩長寔。宜升麻葛根或發熱

惡熱而渴。宜白虎湯太陰經頭痛。其症兼體重多痰。其脉必沉緩

宜南星半夏。蒼朮。或太陰痰厥。亦頭痛。宜柴胡黃芩少陰經頭痛。其症足

寒氣逆為寒厥。其脉必沉細。宜麻黃附子厥陰經頭痛。其症兼項痛

或吐痰。冰冷厥。其脉必浮緩。宜吳萸或肝風虛動頭痛而兼目眩

耳聾

宜熱地黃丸

或怒氣傷肝而亦頭痛

宜沉香散

腎與膀胱經挾寒

濕而頭痛其症亦下虛上寔氣上而不能下

宜玉真丸

心與小腸經挾

濕熱而頭痛其症兼煩心厥逆

宜清空膏加麥冬丹參

三陽經熱鬱頭痛不

敢見日光置水于頂上汗吐下三法並行必愈以上各經頭痛之

異如此而尤緊要者凡遇陰經為患藥必用辛溫如桂附乾姜吳

萸之屬皆可至寔是痛虛痛尤不可混蓋六腑清陽之氣五臟精華

之血皆朝會于頭而六淫五賊之邪皆能犯上為逆或與正氣相

搏鬱而成熱則脈滿而痛

宜茶調散

或邪氣留滯亦脈滿而痛

宜菊萸散

為寔也正氣衰微寒濕侵害雖不與搏而成熱但邪外襲則血凝

澀而脈攣縮收引小路而痛得溫則痛減

宜清室膏

是為虛也夫虛寔

之辨既明而氣血風寒暑濕痰熱之因自別其因氣虛痛者遇勞

更甚耳鳴九竅不利兩太陽穴痛甚其脈大

宜補中益氣湯

如氣上不下

厥而為痛。名氣厥。頭痛。宜芎因血虛痛者。善驚。眉尖後近髮際名

魚尾。自魚尾上攻頭痛。其脉乳。宜四物湯因氣血俱虛痛者。兼有

二症。宜加味調中益氣湯因風痛者。抽掣惡風。或汗自出。宜選奇湯因寒痛者。絀

急惡寒。宜大川芎丸因暑痛者。有汗無汗。總皆惡熱。宜香茹飲因濕痛者。或

胃雨侵露。頭必重。天陰尤甚。宜清空膏去黃芩因痰飲痛者。必昏

重。憤憤欲吐。或痰厥痛。每發時。兩頰青黃。懶于言語。而兼眼黑頭

旋。惡心煩亂。此厥陰太陰合病。宜清空膏去羌活因熱痛者。名熱

厥頭痛。必煩熱。雖嚴冬亦喜風寒。則痛暫止。畧見溫暖。其痛更甚。

宜先服清上瀉火湯次服補氣湯因風熱痛者。必兼目昏鼻塞。宜石膏散因風痰

痛者。吐逆目眩。胸滿吐涎。宜玉壺丸因濕熱痛者。必兼心煩病在膈中。

用吐法大妙。宜清空膏因風濕熱痛者。上壅損目。宜清空膏因鬱熱痛者。頭

旋眼黑。宜川芎散審是病因。更察兼症。審有妄治之過哉。外此更

有傷食頭痛必胸滿惡食吞酸噯腐宜紅九子香砂枳木九加有

傷酒頭痛必口渴神昏宜葛花有臭毒頭痛必煩悶惡心宜炒香

煎有發散太過頭痛必神散氣怯宜乳香有腎虛頭痛必下元虛

弱宜硫黃一兩胡粉一錢飯丸冷水服五錢即止有元陽虛頭痛如破必眼睛如錐刺宜

烏去皮炮全蝎糯米炒等分恨汁丸每十五丸薄荷湯下有頭痛欲裂宜當歸二兩有卒然

頭痛宜姜蚕末熱有頭痛連睛宜牛蒡石膏等分有年久頭痛宜

頭向星末等分葱有產後頭痛宜川芎烏藥末有因頭痛胸中痛

食少咽嗌不利寒冷左寸脉弦急宜麻黃知平此而頭痛之病更

無餘患矣乃治之之法古人多用風藥者以高巔之上惟風可到

味之薄者為陰中之陽自地升天者也故多以風藥取效然亦只

大概言之宜照前分六經治法而加以風藥方可惟犯真頭者最

為難治乃天門真痛上引泥丸故旦發夕死夕發旦死以腦為髓

海真氣所聚。本不受邪。受邪則不可治也。古法進黑錫丹。灸百會穴。猛用大劑參附。可救十中之一。然天柱折。或手足青至節者。必死。固不容忽視之也。

脉法 脉訣曰。頭痛短澀。應須死。浮滑風痰。必易除。又曰。頭痛陽弦。浮風緊寒。風熱洪數。濕細而堅。氣虛頭痛。雖弦必澀。痰厥則滑。腎厥堅寔。又曰。風寒暑濕。氣鬱生涎。下虛上寔。皆暈而眩。風浮寒緊。濕細暑虛。涎弦而滑。虛脉則無。綱目曰。病若目痛。頭痛。脉急短澀者死。入門曰。肝脉溢大。必眩暈。宜預防之。正傳曰。寸口脉中短者。頭痛也。醫鑑曰。寸口緊急。或浮或短。或弦。皆主頭痛。丹溪曰。腎厥頭痛。其脉舉之則弦。按之則堅。又曰。頭腦。左手脉數熱也。脉澀有死血也。右手脉寔。有痰積也。脉大是久病。

真經曰：頭者精明之府，頭傾視深，精神將奪矣。靈樞曰：真頭痛者，頭痛甚，腦盡痛，手足寒至節，並不治。入門曰：傷寒頭重不能舉，有二症，太陽病及陰陽易，並皆頭重不舉，皆危症也。又曰：傷寒陽脈不和，則頭搖，心藏絕及痙病，風盛皆搖頭，皆凶症也。有裏痛而頭搖者，亦重症也。又曰：頭沉痛入泥，九手足冷，爪甲青者，謂之真頭痛，其連齒痛甚者，屬少陰厥症，俱不治。活人書曰：三陽有頭痛，三陰無矣。惟厥陰脈與督脈會于巔，故有頭痛。少陰亦有頭痛，但稀少耳。丹溪曰：頭痛多主于痰，痛甚者，火多也。有可吐者，亦有可下者，諸經氣滯，亦作頭痛。又曰：頭痛連目痛，此風痰上攻，須白芷開之。又曰：頭痛必用川芎，如不愈，各加引經藥。太陽羌活，陽明白芷，少陽柴胡，太陰蒼朮，少陰細辛，厥陰吳萸。東垣曰：風寒傷上部，入客于經。

絡令人振寒頭痛。或風寒之邪。伏留陽經。爲偏正頭風。得效曰真頭痛者。其痛上穿風府。陷入泥丸宮。不可以藥愈。蓋頭中人之根。根氣先絕也。醫鑑曰。頭痛目痛。久視無所見者。死。卒視無所見者。亦死。

頭痛導引法 保生秘要曰。用手法百會穴。掐六十四度。擦亦如之。尋用後功。

逆功 保生秘要曰。左疼。意想左乳下一大肋。扯過右乳下。右疼。則扯過左乳。每行十二度。

頭重目花導引法 保生秘要曰。觀空。坐定。閉氣。以兩手心掩耳。擊天鼓。次擦湧泉穴。次以手按膝端而坐。呵氣九口。如法定神。

運功 保生秘要曰。意定元雍。舌頂上腭。俟液徐生。頻咽丹田。

復想歸原。雙睛運轉。目無花矣。

眩暈。肝風病也。內經曰。頭痛顛疾。下虛上寔。過在足少陰。巨陽甚。則入腎。又曰。狗蒙招尤。目眩耳聾。下寔上虛。過在足少陽。厥陰甚。則入肝。經言下虛。腎虛也。腎虛者。頭痛。經言上虛。肝虛也。肝虛者。頭暈。夫腎厥則顛疾。肝厥則目眩。此其所以異也。故內經又曰。諸風眩掉。皆屬于肝。夫肝為風。風陽邪也。主動。凡人金衰不能制木。則風因木旺而扇動。且木又生火。火亦屬陽而主動。風火相搏。風為火逼。則風烈。火為風扇。則火逸。頭目因為旋轉而眩暈。此則眩暈之本也。若病發之故。則有由外因者。曰。傷風眩暈。必惡風自汗。或素有頭風而發。宜芎藭散曰。火熱上攻。眩暈。必煩渴引飲。或暑月熱甚而發。宜大黃散曰。風痰閉壅。眩暈。必胸膈痞塞。項急。肩背拘倦。神昏多睡。或心忪煩悶而發。宜天麻五錢川芎二兩蜜丸。茨子曰風熱。大食後清茶嚥下。一丸。名天麻丸。

上衝眩暈必胸中不利旋運欲倒或感受時邪而發宜川芎槐子末等分茶下

三錢曰冒雨傷濕眩暈必鼻寒聲宜芎有由內因者曰痰飲眩暈眩

而嘔吐頭重不舉是痰宜清暈化痰湯眩而心下悸是飲宜茯苓曰氣鬱

眩暈必七情過傷痰涎迷塞心竅眉稜骨痛眼不可開宜玉曰虛液湯

衰眩暈宜滋陰使劑湯或內傷氣虛宜補中益氣湯或腎虛氣不歸元氣逆奔上

大補湯宜十全或脾胃虛弱兼嘔吐洩瀉宜歸脾湯曰失血眩暈或吐衄太甚

或便血過多或由傷胎或由產後或由崩漏或由金瘡跌撲拔牙

往往悶絕不省人事宜當歸五錢川芎二錢半水酒煎日再服名芎歸湯曰老人陽虛每早

起便暈須更自定宜黑錫丹此則眩暈之由也然而內因外因之感發

雖殊總必由于痰盛故有風熱痰作眩者宜玉壺丸茶調散合用有寒濕痰

作眩者宜導痰湯加蒼朮秦朮有痰火兼虛作眩并遍身眩暈者宜半夏白

有氣血虛挾痰作眩者宜氣虛宜六君子湯血虛宜二陳湯加芎歸故曰無痰不作眩也

而又有不至于眩暈之甚但頭目不清利宜川芎散或并耳鳴耳聾宜清神且精神不爽咽乾鼻塞者宜沃皆由風濕熱痰涎鬱于精明之府也

眩暈原由症治 靈樞曰上虛則眩又曰上氣不足目為之眩

此言又曰藏府筋骨血氣之精與脉并為目系上屬于腦後宅

于項中故邪中于項因逢其身之虛其入深則隨眼系以入于

腦入于腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣此

風入而眩 河間曰眩暈則嘔吐風熱甚也 醫鑑曰眩暈者痰因

火動也蓋無痰不能作眩雖因風者亦必有痰 丹溪曰痰在

上火在下火炎上而動其痰二陳湯加酒芩山梔黃連蒼朮羌

活可以治之此言 痰眩 入門曰眩暈或云眩冒眩言其黑暈言其

轉冒言其昏其義一也又曰眩暈皆稱為上盛下虛蓋虛者氣

與血也。寔者痰涎風火也。正傳曰：眩暈者中風之漸也。肥白人四君子湯多加蜜黃芪加陳皮半夏少加川芎荆芥以清頭目。黑瘦人二陳湯合四物湯加黃芩薄荷入竹瀝姜汁童便。又曰：凡眩暈語亂汗多下利時時自冒者虛極難治。回春曰：泄瀉多而眩暈時時自冒者難治。

頭暈腦痛及痰滯導引法 保生秘要曰：單搭膝坐二指點閉耳門及口眼鼻七竅之處躬身微力前努使真氣上升腦邪自散矣。

運功 保生秘要曰：注臍念想頭上痛處分兩邊運至心口開下念臍輪斡旋通關緊行至滯痰處着意多運週流遍腹顧念臍。

神暈頭暈導引法 保生秘要曰：此症情慾所傷氣衰血少心

火上攻。痰飲串肺爲患。日久變成勞瘵。于肩井穴。搯九九。擦九九。兼用後功自愈。

運動 保生秘要曰。緊閉地戶。安神伏氣。按腦及耳。大量要倚坐。足掘勿交。神氣自回。得法。因津咽下。定神。

風頭旋肝風病也。肝風盛則頭自搖動。別無疾痛。不自覺知。治法與頭風畧同。總應以平肝爲主也。

風頭旋症治 綱目曰。有一子。患七年搖頭。三年下血。百方無效。予思之。乃肝家血液盛。外有風熱乘之。肝木盛而尅脾土。脾與肺是子母。俱爲肝所勝。而血遂瀆于大腸。故便血不止。遂處一方。但損肝。驟風而益脾。用防風三兩。花粉蜜黃芪羌活白芍各五錢。犀角甘草各三錢半。炙蛇壳鈎鈎麻黃各一錢。棗肉丸。食後薄荷湯下。五七十九。只二服。頭搖卽止。十餘服。血止而下。

白。又二服乃愈。

頭風風寒入腦髓病也。凡人素有痰火風寒客之。則熱鬱而悶痛。

故婦人多患此者。無巾櫛故也。總之新而暴者為頭痛。深而久者。

為頭風。頭風不速治必害眼。其痛有正有偏。丹溪曰。凡偏頭風左。

為風虛。右為痰熱。丹溪雖分言之。其是總屬于肝。虛有痰治之者。

雖左風必用荆防羌薄。左虛必用芎歸。右痰必用蒼夏。右熱必用。

芩膏。其寔補肝豁痰之品。必當兼用。補肝宜山藥木瓜棗仁羚羊

紅。是所宜知者也。凡患偏正頭風。有兼惡寒頭面多汗者。宜茶調散加生

黃。搐鼻出涎法。大妙。宜透散有兼鼻流鼻涕。他藥不效者。宜芎有頭

風冷者。宜蕎麥麵二升作餅更有頭風熱痛者。宜山豆根末油有

頭風項強者。宜八月後取荆芥穗作有頭風旋運。痰逆惡心懶食。

者。宜零陵香薷香葉莎草根等有偏正頭風。並夾頭風。連兩太陽

分每末二錢茶下日三服

穴痛者

宜姜蚕末葱茶下七分及沈氏頭風丸

有偏正頭風氣上攻不可忍者

宜全蝎散

有偏正頭風痛不可忍者

宜龍香散

有偏正頭風不拘遠近諸藥不效

者

宜牛腦

有腦冷漏下者

宜白鷄冠子酒煎服效

有頭腦鳴響狀如虫蛙名曰

天蟻者

宜茶子末吹鼻效

有頭風多白屑作痒者

宜零陵香白芷煎汁入鷄子白攪勻俾數十次

終身不生

各依症治之自無不效而半邊頭痛另有仙方宜仙方及外治

法

宜草麻子低捲

亦俱效更有雷頭風者頭痛而成核塊頭面腫痛憎寒

壯熱狀如傷寒病在三陽不可過用寒藥誅伐

宜沈氏荷葉湯或頭中如

雷之鳴為風邪所客故也腫核宜刺出血

宜清震湯

亦有因痰熱者痰

熱生風也

宜祛痰丸

更有夾腦風者兩太陽連腦痛是也

宜透頂散

更有大

頭風者頭大如斗俗名大頭瘟天行時疫病也感天地不正之氣

甚而潰裂出膿由邪客上焦之故

宜普濟消毒飲

其相類而病輕者名發

願腫在耳前後

宜甘桔湯加薄荷荆芥連喬黃芩牛蒡子

頭風痛

卷二

頭風症治 醫鑑曰頭風之症。素有痰飲。或櫛沐取涼。或久臥當風。以致賊風入腦入項。自頸以上。耳目口鼻肩稜之間。有麻痺不仁之處。或頭重。或頭暈。或頭皮頑厚。不自覺知。或口舌不仁。不知食味。或耳聾。或目痛。或眉稜上下掣痛。或鼻聞香極香。聞臭極臭。或只呵欠而作眩暈之狀。熱者消風散。冷者追風散。頭風發時悶痛。必欲棉裹者。熱鬱也。二陳湯加酒芩。荆芥。川芎。薄荷。石膏。細辛。婦人頭風。宜養血。祛風湯。葉天士曰。有氣血皆虛。新涼上受。經脈不和。腦後筋掣牽痛。倏起倏靜者。乃陽風之邪。宜荷葉邊。苦丁。茶蔓。荆子。甘菊。連喬。有內風。頭痛淚冷者。宜杞子。首烏。茯神。柏子仁。菊花。炭。檉豆皮。有痛在頭左。屬後厥陰風木上觸者。宜細生地。白芍。炒杞子。柏子仁。茯神。甘菊。有暑風濕熱。混于上竅。津液無以運行。凝滯而成偏頭痛。舌強乾潤。

者宜連喬石膏滑石甘草荷梗桑葉羚羊角蔓荊子有失血過多。陰氣大傷。陽氣浮越。頭痛筋惕。脈數虛而動。當用鎮攝者。宜人參阿膠牡蠣生地白芍天冬炙草。

正頭風痛 靈樞曰。凡手三陽從手走頭。足三陽從頭走足。是手足六陽脈。俱上于頭面也。又曰。足太陽脈上額交巔。直入絡腦。別下項。其病衝頭痛。目似脫。項似拔。卽正頭痛也。

偏頭風痛 靈樞曰。足少陽之脈。起目銳眥。上抵頭角。其病頭角額痛。子和曰。頭風之甚者。久則目昏偏頭風痛者。屬少陽相火。久則目縮。小大便秘澀。皆宜出血而大下之。入門曰。偏頭痛。年久大便燥。目赤眩暈者。此肺乘肝。氣鬱血壅而然。宜大承氣湯大下之。外用大黃芒硝爲末。井泥調貼兩太陽穴。乃能愈也。

日行頭風導引法 保生秘要曰此症定宜先導引次行右法
握固搭膝而坐以手捫兩耳塞兌閉目用意躬身前努使七竅
之氣上攻邪氣自然退散矣

運功 保生秘要曰手脚屈拳閉口存想自泥丸而起漸想至
湧泉候汗出而自愈蓋從頭汗上而下出邪氣淨降矣

首風風傷于衛病也蓋沐則腠理皆開而風為陽邪善行而易入
乘其腠之開邪遂襲而入則衛受之故成首風其症頭面多汗必

惡風

宜大川芎丸

或沐浴後眩暈頭痛亦首風類

宜白芷丸

首風症 醫說曰不槩入頭風條例而獨立其名曰首風見此
症專由沐後而得所以別于頭風之由于六淫七情者也古人
就病定名意深哉

腦風風邪客腦病也腦者居于頭蓋骨中百會穴分即其部也

樞曰。腦為髓之海。髓海有餘。則輕勁多力。不足。則腦轉耳鳴。脛痠眩。目無所見。經文此言。腦之本病也。若風邪入于風府。由風府而上。入于腦。則有腦風之症。其狀項背怯寒。腦戶穴冷。宜神聖散亦有風邪。但攻于上焦。而邪氣上熏。令人日夜頭痛不止者。亦為腦風。宜太陽丹。宜分別治之也。

腦風原由。內經曰。髓者。骨之充也。髓傷則腦髓消。燦體解。仿然不去也。註云。不去者。不能行去也。入門曰。腦者。髓之海。諸髓皆屬于腦。故上至腦。不至尾骶。皆精髓升降之道路。

腦疽。勝。肌。經。積。熱。病也。如初起腫痛甚。煩渴引冷。脈數有力者。由濕毒上壅。如漫腫微痛。渴不飲冷。脈雖數而無力者。由陰虛火熾。濕毒宜黃連消毒。飲陰虛宜六味丸。若不成膿。不潰腐。陽氣虛也。宜四君子湯。加歸芪。不生肌不收斂。脾氣虛也。宜十全大補湯。然陽虛脾虛之患。凡外症。皆然。不獨腦

疽已也。宜知之。又有腦爛。初起即如木樨。上起頂門。下至大椎。發
 腫如火燒。色青黑。不潰。只損外皮。如犬咬去肉一般。即潰亦不歛。
 皆由陰精消燦之故。此死症也。古無治方。又有腦癰。皮薄易破。此
 輕症。宜清熱
消毒飲非如腦疽皮厚難治。急當內托也。薛立齋言凡患腫
 毒欲成膿腐潰。生肌收斂。並用托裏為主。此至言也。故立齋于托
 裏消毒散一方。多設加減法。加減法
載在前亦欲人知所以用之耳。仙方
 活命飲亦癰疽初起之聖藥。又有赤疽。發太陽穴。其形不拘大小。
 以速破見膿。既膿速斂為要。以額角近連太陽皆要害處。若腫滿
 太陽。即成虛損。難于收拾。若既破而傷風水。即能殺人。瘍科書言
 此症七日刺不得膿。十日不穴必死。誠有見于此症之不易療也。
 至若太陽穴生癰疽。與目相近。不于五六日內急破之。毒氣攻眼。
 則眼合不開。破後更傷風水。則目睛必傷。其癰疽發于眉頭者。亦

必攻入眼目。發在眉後者。又必攻入太陽。皆要害處。不可忽者。

頭瘍症治 陳文治曰。腦疽初起。宜黃連消毒飲。腫硬作痛。繼

以仙方活命飲一二劑。蓋此病原屬虛火。按之脉數而濡。乃濕熱壅盛。故用黃連消毒飲。腫硬作痛。乃氣血凝滯。故用仙方活命飲。並以甘溫之劑。補益陽氣。托裏而潰腐之。不宜用苦寒傷其胃氣。反致不得腐化。凡瘡易消散。易腐潰。易收斂。皆氣血壯盛故也。可以類推。又曰。昔杜碧清患腦疽。自藥不愈。丹溪治之。令服防風通聖散。答曰。已數服。丹溪云。宜皆以酒製。杜悟。急服乃瘥。

治頭痛方二十七

羌活附子湯

犯腦 羌活 附子 防風 黃芩 升麻
白芷 甘草 黃柏 麻黃 姜萎 蒼朮

玉真丸

下虛 硫黃二兩 石膏 半夏 硝石各一兩
姜汁丸 每二十九 姜湯下 寒甚者去石

身形

頭痛方

卷五十五

膏加鍾乳粉灸關元穴

補中益氣湯
人參 黃芪 歸身 白朮 升麻
陳皮 炙草 姜 棗

白虎湯

麻黃細辛湯
麻黃 附子 細辛

生熟地黃丸
生地 熟地 枳壳 甘菊 防風
羌活 杏仁 金石斛 蜜丸 每三錢

食前用豆淋酒送下

鈎藤散
又 鈎藤鈎 陳皮 半夏 茯苓 麥冬
甘草 石膏 人參 甘菊 防風

沉香降氣散
沉香 木香 柴胡 白芍 細辛
陳皮 蘇子

清空膏
羌活 防風 柴胡 川芎 黃連
甘草 每末三錢 臨臥茶清下

茶調散
白芷 五錢 薄荷 二錢 荆芥 四錢 細茶 三錢
頭痛 加細辛 藜本 蔓荊子 各三錢 爲末茶調

菊花散
甘菊 旋覆 防風 枳壳 羌活 石
蔓荊子 甘草 各錢半 姜 三片

四物湯

血虛 川芎 當歸 白芍 地黃

加味調中湯

氣虛 黃芪一錢 人參 炙草 蒼朮各七
分 陳皮 當歸 川芎各五分 木香 蔓
荆 升麻 柴胡 細辛各三分

選奇湯

防風 羌活各三錢 黃芩一錢 甘
草 夏冬各八分 厚朴 扁豆 甘草

香菇飲

清上瀉火湯

因熱 羌活 藜蘆 防風 人參
當歸 知母 黃柏 黃芩 黃連 黃芪
白朮 升麻 細辛 甘草 生地 紅花

芎烏散

蔓荆子 此方奇效之至
氣厥 川芎 烏藥 等分 每末二錢以燒秤
鍾產酒下 兼治產後頭痛

補氣湯

因熱 升麻 黃芪 炙草 細辛 當歸
木香 一方有麻黃對酌用之
風熱 石膏 麻黃 首烏 葛根

石膏散

神芎散

又 蔓荆子 青黛 川芎各錢二分 鬱金
芒硝各一錢 石膏一錢半 細辛一錢
薄荷二錢 紅豆一粒 爲末搗鼻

身形

頭腦痛方

眩暈方

卷二十五

四六

安神散

酌熟 黃芪 羌活 黃柏各一兩 防風二
錢半 酒知母 羌活 酒生地 柴胡 升麻各五
錢 生甘草 炙甘草各三錢 每末五錢水
煎服 加蔓荊子五分 川芎三分 尤妙
又 薄荷 羌活 荆芥 柴胡 川芎 甘
菊 細辛 槐子 茵陳 香附 石膏 生
甘草

川芎散

香砂枳朮丸

傷食 木香 砂仁 枳壳 白朮

紅丸子

又 三稜 蓬朮 乾姜 青皮 陳皮 胡
椒 醋糊丸 凡紅為衣

葛花解醒湯

傷酒 人參 茯苓 木香 陳皮 砂仁
神曲 葛花 薏仁 知母 青皮 猪苓
過殼 栗壳 陳皮 甘草 桔梗 柴胡

乳香落蓋散

乳香 麻黃 吳萸 升麻 蒼朮 羌活
寒冷 柴胡 黃芩 黃連 黃柏 半夏
藥本 川芎 細辛 紅花 蔓荊子

麻黃吳萸酒

川芎 細辛 紅花 蔓荊子

治眩暈方八

玉壺丸

風熱 南星 半夏各一兩 天麻 五錢
越三兩 蜜丸 每三十九丸 洗時亦一碗 煎滾下

藥浮即熟輕輕撈起姜湯下

茶調散

又 黃芩 川芎 細茶 白芷 荆芥 薄荷

導痰湯

寒濕 半夏四兩 南星 枳寔 赤苓 橋
紅各一兩 炙草五錢 每末四錢加姜十片
食後煎服

十全大補湯

元虛 人參 黃芪 當歸 白朮 肉桂
白芍 熟地 茯苓 川芎 炙草 姜 棗

補中益氣湯

氣虛 人參 黃芪 當歸 白朮 柴胡
升麻 甘草 陳皮 白朮

四物湯

血虛 川芎 當歸 白芍 熟地

六君子湯

挾痰 人參 茯苓 白朮 炙草 半夏
陳皮

二陳湯

又 茯苓 半夏 陳皮 甘草

治頭風方十九

茶調散

偏正風 黃芩 川芎 薄荷 荆芥穗 白芷 細茶

透頂散

橋鼻 細辛 二莖 瓜蒂 七个 丁香 三粒
糯米 七粒 冰片 麝香 各分半 先研藥細

芎犀散

後入水磨研勻每用豆許隨病人左右搗之良
久出涎碗許乃愈
臭梯 川芎 珠砂 石膏 片腦 人參
茯苓 炙草 細辛 犀角 山梔 麥冬
阿膠

沈氏頭風丸

兩邊痛 煨天麻 麩枳壳 酒白芍 炒黑
瓜蒌仁 子木炭各一兩 姜炒半夏曲 煨
蛤粉 炒焦棗仁各兩半 黃連吳萸五錢同
炒去黃 砂仁 甘菊 炙草各五錢 酒歸
身四兩 沉香屑四錢 檀香屑三錢 金石
斛三兩 黑棗肉二十枚煎湯代水泛丸空心大
棗湯下二錢 此余自製方也用之屢效

全蝎散

氣攻 全蝎廿一个 地龍六條 土狗二个
五倍子五錢 為末 酒調難貼太陽穴上
痛極 地龍去土焙 乳香 等分為末每以
一字作紙捲燈上燒烟以鼻喘之

龍香散

頭風 白芷 川芎各三錢為末抹黃牛腦子
上藥器內加酒頓熟乘熱食之盡量一醉醒則
其病如失甚驗

牛腦丹

牛腦子

亂仙方

半邊痛 詩曰辛本羌歪荷半夏防荆芎芷附
天麻三分蘇草麻黃共水酒煎時加細茶

草麻子紙捲

又 草麻子去壳五錢 大藥去核十五个
共搗如泥塗紙上用箸一隻捲之去箸納鼻中
良久取下清涕即止

沈氏解雷湯

雷頭風 落帚子三錢 升麻 川芎 製茅
木各一錢 先將鮮荷葉一張摺疊不得扯碎
水二碗半煎至二碗再入藥加生姜三片煎七
分服 此再平自製方也每用一二帖即愈
又 升麻 蒼朮 荷葉各四錢 食後服

清震湯

祛痰丸

又 姜製皂角 半夏各一兩 大黃酒浸紙
包煨再浸煨三次二兩 橘紅 桔梗 天麻
各五錢 片苓七錢 薄荷三錢 青礬石
白芷 甘草各一錢 蒸餅九臨臥茶下
大頭風 黃連 黃芩各八分 人參 柴胡
桔梗各五分 元參 橘紅 甘草各四分
牛蒡子 連喬 板藍根各一分 馬勃二分
分 姜蚕 升麻各三分 薄荷六分 便秘
加酒大黃一錢

普濟消毒飲

甘桔湯

發風 甘草 桔梗

消風散

熱頭風 荆芥 甘草各一錢 人參 白茯苓
姜蚕 川芎 防風 藿香 羌活 白
身形 頭風方 首風方 卷三十五 四式

追風散

脫各五分 陳皮 厚朴各三分 加細茶一撮 每末二錢茶下
冷頭風 炮川烏 熟石膏 炒姜蚕 荆芥
穗 防風 川芎 甘草各五錢 製南星
製白附子 羌活 天麻 地龍 全蠍 白
芷各二錢半 炮草烏 乳香 沒藥 雄黃
各錢二分半 每末五分 臨臥茶酒下

二陳湯

熱鬱 茯苓 陳皮 半夏 甘草

養血祛風湯

婦人 當歸 川芎 防風 生地 荆芥
羌活 細辛 藜本 石膏 半夏 甘草
旋覆花 蔓荊子各五分 姜三棗二

大承氣湯

偏頭風

治首風方二

大川芎丸

首風 川芎四兩 天麻一兩 蜜和每兩作
十九每九細嚼茶酒任下

白芷丸

又新白芷不拘多少對以蘿蔔汁浸晒乾
為末蜜丸彈子大每一丸細嚼荊芥湯下
名都梁丸 凡頭風眩痛服之令人目明
暴寒乍暖神思不清頭目昏暈並宜服之

治腦風方二

神金散

太陽丹

腦風 葛根半生半炒 麻黃 細辛 藿香
等 等分爲末 每二錢 薄荷 荆芥 湯下
又 石膏二兩 川烏 川芎 白芷 甘草
各一兩 冰片二錢 蜜同 麴糊 丸每兩作十
八九 東丹爲衣 食後 葱茶湯 嚼下 二三丸

治腦疽方八

黃連消毒飲

腦疽 酒黃連 酒生地 酒歸身 羌活
黃芪 連喬各一錢 澤瀉 七分 酒防已
黃芩 黃柏 獨活 防風 藜蘆 蘇木
陳皮 桔梗各八分 酒知母 四分 人參
甘草梢各五分 一名黃連消毒散
此方治腦疽背疽癩腫疼痛或麻木膏梁之人
尤宜用此

六味丸

四君子湯

陰虛 地黃 山藥 山萸 丹皮 茯苓
陽虛 人參 茯苓 白朮 炙甘草

十全大補湯

脾虛 人參 黃芪 當歸 白朮 白芍
肉桂 熟地 茯苓 川芎 炙草 姜 棗
斷氣方 頭高方 卷下五 四九

身形

斷氣方

頭高方

卷下五 四九

清熱消毒飲

川芎 黃連 山梔 當歸 連翹各一錢
川芎 白芍 生地各錢半 炙草八分 金銀花二錢

托裏消毒散

此方治癰疽發十陽癰痛發熱作渴
總治 人參 監黃芪 酒當歸 炒白芍
川芎 炒白朮 茯苓各一錢 白芷 金銀
花各七分 炙草 連翹各五分
此方治胃氣虛弱或因尅伐不能潰散服此未
成即消已成即潰腐肉自去新肉自生

仙方活命飲

又 穿山甲炒黃 白芷 防風 赤芍 甘
草 貝母 角刺 歸尾 花粉各一錢 陳
皮 金銀花各三錢 乳香 沒藥各一錢 二
味另研為末先將藥水酒各半煎好送二末

酒製防風散

附錄瘍科選粹治腦疽方二

羌活當歸湯

酒黃連 酒黃芩 酒歸身各二錢 羌活
黃柏 連翹各一錢 炙甘草五分 澤瀉
獨活 藁本各七分 山梔 防風各五分
水三酒七煎食後服日進三帖三日乃愈

蓮荷針頭丸

麝香二錢 血竭 鱉酥 輕粉 礞砂各三
錢 全蝎 蜈蚣各一對全用 水片一錢

蜜丸黍米大瘡頭用針挑破微有血出以藥一
粒放進挑破眼內用棉帛蓋之周圍以津唾粘
定不一時愈
此丸治一切腦背惡瘡欲死一粒可愈

身形 漸瘦方

卷五十五